

"中美" 康淨膚[®] 乳膏

KANFU Cream "C.M."

衛署藥製字第031063號

本劑由4種基本療效成分組成，即兼具消炎、止癢、殺菌及殺黴菌的作用，同時因4種活性成分之不同藥理作用，故對原因不明的皮膚疾患或各種皮膚病症均可優先投予治療。

【成分】Each gm Contains：

Nystatin.....100,000 units
 Neomycin (as sulfate).....2.5mg(Potency)
 Gramicidin.....0.25mg(Potency)
 Triamcinolone Acetonide.....1mg
 Glyceryl Monostearate、Propylene Glycol、Isopropyl Myristate、Methyl Paraben、Propyl Paraben、Butylated Hydroxyanisole、Lanoline Anhydrous、Cream Base Wax No.80、Stearic Acid、Bouquet AT 60562、Purified Water

【特徵】

Gramicidin 與 Neomycin Sulfate兩者為廣效性抗生素，配合一起可發揮相乘的殺菌效果，不論是革蘭氏陽性菌或陰性菌，同時可防止其繼發性感染。

Nystatin具有徹底殺滅致病性黴菌之效果，又 Triamcinolone Acetonide 為具有優秀的消炎、止癢作用，可迅速消除各種皮膚發炎、搔癢現象。此4種主要成分相互配合，對細菌、黴菌混合感染及併發炎症性皮膚病灶，可提供優秀之治療效果。

【適應症】外陰搔癢、濕疹（異位性、接觸性、漏脂性、毛囊性、彎曲處、創傷後感染性、錢幣形、壅滯性及嬰兒性濕疹）、神經性皮炎、外耳炎、肛門搔癢及牛皮癬。

【用法用量】每天2-3次，取出適量塗抹於患處。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

- 1.若治療區域擴展時，則應避免副腎皮質荷爾蒙全身性吸收的增加。
- 2.若皮膚產生刺激感時，請即停止塗敷，必要時請就醫診治。
- 3.本藥品僅供外用，不得用於眼睛及口腔內膜。
- 4.為避免再復發，症狀消除後需再繼續使用一段時間，直至感染完全終止。
- 5.除非醫師指示，使用本品時請避免以繃帶包紮患部。
- 6.妊婦、授乳婦及兒童應評估利弊後小心使用。
- 7.對下列藥物有過敏往歷者，宜慎重使用：
Amikacin、Gentamycin、Kanamycin、Neomycin、Streptomycin、Tobramycin。
- 8.使用本藥1~2週後，症狀若無明顯改善，應考慮以其他藥物治療。
- 9.請置於小孩伸手不及處。
- 10.請儲存於陰涼處，避免陽光直接照射。
- 11.陰道感染使用本藥時，請夫妻同時治療，避免因交叉感染而復發。
- 12.結核性損害或病毒性皮膚症狀，如牛痘、單純疱疹、水痘等，禁用本藥。

【副作用】偶而有發疹、脫皮、搔癢、灼熱等不適現象發生。

【包裝】100gm 以下鋁軟管裝、1000gm 以下塑膠罐裝

【儲存條件】25°C 以下避光儲存

委託者：



興中美生技有限公司
 Sino Advance Biotech Co., Ltd.
 台北市內湖區瑞光路618號5樓之1 電話:02-87513383

製造廠：



PIC/S GMP藥廠

中美兄弟製藥股份有限公司
 彰化市彰鹿路106號 諮詢專線：04-7524166
<http://www.chungmei.com.tw>