

濕疹、牛皮癬 皮膚疾患治療劑

皮立潔[®]乳膏 0.5公絲/公克(可洛貝他索)

PIRIGEN[®] Cream 0.5mg/gm(Clobetasol)

衛署藥製字第028578號

皮立潔乳膏係高效性局部使用腎上腺皮質固醇製劑，經臨床使用證明對皮膚疾患療效優異，尤其治療濕疹、牛皮癬更具顯著效能。對其他類固醇製劑無效時，本劑可發揮確切滿意療效。

【成分】每gm中含：

Clobetasol Propionate.....0.5mg
 Propylene Glycol、Propyl Paraben、Methyl Paraben、
 Stearic Acid、Sorbitan Monostearate(Nikkol SS-10)、
 POE(20) Sorbitan Monostearate、
 Sorbitan Monostearate(Nikkol SO-10)、
 Glyceryl Monostearate、Perfume T1331

【藥理作用及特點】

- 療效迅速確實，依據對人體皮膚血管收縮試驗，其局部抗炎活性約為Fluocinolone Acetonide之18.7倍。
- 對其他類固醇製劑無效時，本劑為最佳選擇。

【適應症】

牛皮癬、乾癬、濕疹、皮膚炎症（進行性指掌角皮症）、苔癬、癢疹、掌跖膿疱症。

【用法用量】

少量均勻地塗於患處，每日一至二次，繼續使用至病況好轉，病症嚴重可一日四次。本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

- 濕疹或皮膚炎患者，應注意若有皮膚感染伴隨時，應配以抗菌劑或抗真菌劑來治療。
- 當需要較長期之治療時，與其他局部類固醇製劑一樣，在病情未加檢討前，其連續使用期不要超過四週。
- 用於臉部及頸部治療時，儘可能做短時性使用。
- 具有皮膚結核、單純疱疹、水痘帶狀疱疹、種痘疹或對本劑有過敏性之患者，應禁止使用。
- 長期使用本劑若有過敏性之皮膚症狀發生，應即停止使用本劑，若有皮膚感染性症狀時，再配以抗菌劑或抗真菌使用時，若未見改善則宜暫停本劑，俟感染之皮膚獲得控制後再行敷用。
- 若有腦下垂體、腎上腺之壓制作用時，短時停藥後即可恢復正常。
- 妊娠期不可廣泛使用本劑。
- 嬰兒及小兒應避免長期使用本劑，以免發生其副腎之壓制作用。
- 眼臉皮膚使用時，應注意不要大量且長期使用，以免引起眼壓亢進。
- 使用類固醇治療乾癬，偶有膿疱症及紅皮症現象，通常本劑之耐量良好，但發生時，應立即停藥。

【包裝】1000公克以下管裝

委託者：



興中美生技有限公司
 Sino Advance Biotech Co., Ltd.
 台北市內湖區瑞光路618號5樓之1 電話:02-87513383

製造廠：



PIC/S GMP藥廠
中美兄弟製藥股份有限公司
 彰化市彰南路100號 諮詢專線: 04-7524166
<http://www.chungmei.com.tw>