

末梢性神經障礙治療劑

"中美" **脈亦通** 膠囊 0.5毫克

Maiyitong capsules 0.5mg (Methylcobalamin) "C.M."

衛署藥製字第029759號

"脈亦通"乃末梢性神經障礙治療劑，在核酸、蛋白質、脂質代謝上是B12同族體中最具有優越性的身體活性者，在藥理學上，對各種原因所引起的軸索變性、脫髓等神經障害、具有神經修復作用。另外，也能促進紅血球之正常生成及成熟化，改善貧血現象。在臨床上，對糖尿病性神經障礙、多發性神經炎及顏面神經麻痺等末梢性神經障礙確有療效。

成分：每粒含
Methylcobalamin.....0.5mg
其他成分：Starch Corn、Lactose、Magnesium Stearate

作用：1. Methylcobalamin是大量存在於血液，體液的活性型B12，在身體內直接參與Transmethylation反應，在核酸、蛋白質的代謝上，其作用乃是Homocystein合成Methionin過程中極為重要之輔助酵素。此外，它可促進Methionin合成反應中所生成貯藏型葉酸的利用，並直接參與t-RNA之Methylation等核酸代謝反應，促成蛋白質的合成。

2. Methylcobalamin在脂質代謝方面，參與各種磷質脂的合成，特別是促進Lecithin的合成。在動物試驗中，對於已受到神經障礙的白鼠，不但可以促進神經細胞內核酸合成，並有加速神經纖維再生及髓鞘形成的報告。

3. 健康成人以Methylcobalamin每日1.5mg連續服用七日後，Vitamin B12血中濃度會徐徐增加，經過80小時後可達最高(平均2.53ng/ml)，主要經由尿中排出。

適應症：末梢性神經障礙。

用法用量：成人一次一粒、一日三次，可按年齡及症狀適宜增減之。
本藥須由醫師處方使用。

注意事項：1. 一般的注意：使用過後，若無效果顯現時，請勿作長期之使用。

2. 副作用：(一)過敏症：若有發疹等過敏症狀出現時，請暫停服用。

(二)消化器：偶有胃部不適、食慾不振、噁心、嘔吐、下痢、腹痛等症狀。

3. 其他：從事水銀及其化合物有關之職業者，應避免長期服用。

4. 本劑對光不安定，故需遮光保存。

包裝：6-1000粒盒裝瓶裝

委託者：

興中美生技有限公司
Sino Advance Biotech Co., Ltd.
台北市內湖區瑞光路618號5樓之1 電話:02-87513383

製造廠：



PIC/S GMP藥廠

中美兄弟製藥股份有限公司

彰化市彰鹿路106號 諮詢專線: 04-7524166

<http://www.chungmei.com.tw>