

膚寧通藥膏

FRADIOCORT Cream "C.M."

衛署藥製字第007821號

"中美" 膚寧通藥膏含有類固醇Triamcinolone Acetonide用於治療皮膚病，另含有Neomycin Sulfate，為一種對革蘭氏陽性、陰性及耐酸性細菌具有廣效之抗生素，可殺滅侵入皮膚組織之細菌。

【成分】Each gm Contains：

Triamcinolone Acetonide.....1mg
Neomycin Sulfate.....5mg(eq. to Neomycin 3.5mg)
Cream Base Wax No.80、Glyceryl Monostearate、Propylene Glycol、Isopropyl Myristate、Methyl Paraben、Propyl Paraben、Butylated Hydroxyanisole、Silicon Oil、Cetyl Alcohol、Stearic Acid、Bouquet(AT 60562 Flavour)、Stearyl Alcohol、Purified Water

【適應症】過敏性皮膚炎、脂溢性皮膚炎、異位皮膚炎、接觸性皮膚炎、濕疹、錢幣形濕疹、紅皮症、濕疹性牛皮症及外耳炎。

【用法用量】直接塗擦於洗淨之患部，一日3-4次。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

1.原則上確認其對細菌之感受性再使用，防止耐性菌之產生，在最短期間及治療上之最小劑量達到治療之目的。

2.一般注意事項：

a/罕有搔癢、發紅、腫脹、丘疹，小水泡等過敏現象，若發生此現象應立即停止使用。

b/廣範圍之燙傷、潰瘍之皮膚避免長時間連續使用。

3.若未達療效時應配合或改用其他抗菌劑或抗真菌劑。

4.大量或長期廣範圍之密封法(ODT)使用時，與副腎皮質全身投與有相同之副作用。

5.禁忌：

a/對Streptomycin, Kanamycin, Gentamycin, Neomycin等之胺基糖苷類抗生素過敏者。

b/皮膚結核、單純疱疹、水痘、帶狀疱疹、種痘疹。

c/對Triamcinolone過敏者。

d/有鼓膜穿孔之濕疹性外耳道炎。

e/潰瘍、第二度以上燙傷、凍傷。

6.副作用：

a/為考慮對腎臟及聽覺神經之副作用，避免長期使用。

b/皮膚之感染症：皮膚真菌性(念珠菌症、白癬等)及細菌性(傳染性膿痂疹、毛囊炎等)感染症產生時(密封法(ODT)之治療最易引起)，應適當併用其他抗真菌劑、抗菌劑，如果症狀未見迅速改善時應停止使用。

c/其他之皮膚症狀：長期連續使用，副腎皮質性痤瘡(尋常性痤瘡相似之白色面皰有發生之傾向)，副腎皮質性酒皰及口周圍炎(口周圍、罕有顏面紅斑、丘疹、毛細血管擴張、痂皮、鱗屑生成)、副腎皮質性皮膚(皮膚萎縮、毛細血管擴張) 很少有魚鱗癬樣皮膚變化紫斑，多毛及色素脫失之現象，如有此情形發生時應改用不含副腎皮質之藥劑。

d/過敏性：罕有皮膚之刺激、發疹等現象，如有發生時應停止使用。

e/腦下垂體、副腎皮質系機能：大量或長期廣範圍之密封法(ODT)使用，對腦下垂體、副腎皮質系機能會有抑制應注意。

f/眼：眼瞼皮膚，使用時應注意眼壓增高及綠內障之產生，大量或長期廣範圍使用密封法(ODT)治療時應注意白內障及綠內障。

g/孕婦之使用：孕婦使用之安全性未建立，對於孕婦或可能懷孕之婦人避免長期大量使用。

h/乳幼兒之使用：長期連續使用恐對發育會有所影響。

7.高齡者因生理機能衰退應小心使用。

8.使用上注意，不可使用於眼科。

9.應保存於室溫陰涼處。

【包裝】：100gm以下軟管裝；500gm罐裝

委託者：

 興中美生技有限公司
Sino Advance Biotech Co., Ltd.
台北市內湖區瑞光路618號5樓之1 電話:02-87513383

製造廠：

 PIC/S GMP藥廠
中美兄弟製藥股份有限公司
彰化市彰南路106號 諮詢專線: 04-7524166
http://www.chungmei.com.tw