

請由此剪開

請封後請速將拉鍊密封

PIC/S GMP優良藥品


肌肉痛、關節炎
肩膀、腰、背痠痛
扭挫傷、跌打撲傷



"中美"舒筋樂

酸痛藥布 70毫克

SUCHILA INDOMETHACIN PAP 70mg "C.M."



水性基劑、溫和不過敏
柔軟性佳、伸縮力強
透氣性高、使用舒適
效果持續、藥效溫和
能滲入皮膚組織及關節患部

外用
5片

製造批號：
保存期限：



請由此剪開

請封後請速將拉鍊密封

"中美"舒筋樂

酸痛藥布 70毫克



- 柔軟性佳、伸縮力強：本品為伸縮力強的含水貼布，因使用伸縮自如的不織布質料，故適合貼於活動力強的關節部位，如膝蓋、腰部、手肘等。
- 透氣性高、使用舒適：本品保濕性強，透氣性佳，不受溫濕度變化，保持患部舒適，撕去時不疼痛且不殘留膏體。
- 效果持續、藥效溫和：水性貼布能持續釋出有效成分（非類固醇系的鎮痛消炎劑Indomethacin），滲入皮膚組織及關節患部，促進血液循環、鎮痛消腫、藥效溫和，對肌肉痛、關節炎、肩膀、腰、背痠痛、扭挫傷、跌打撲傷等發揮療效。
- 使用保存便利：附有拉鍊，保存方便，能防止藥布乾燥。

藥物資訊

成分：Each 14gm(10cmX14cm)Contains：
有效成分及含量：Indomethacin 70mg/片
其他成分(賦形劑)：Purified Water, Gelatin, Tartaric Acid, Alcohol, L-Menthol, Polysorbate 80, Sorbitan Sesquilester, Glycerin, Kaolin, Titanium Oxide, Methyl Paraben, Sodium Polyacrylate, Sodium Carboxymethylcellulose, Sorbitol Solution 70%, Polyacrylic acid, Nikasol TS-620。

用途(適應症)：暫時緩解局部疼痛。

不得使用的族群：曾因本藥成分引起過敏的人。

用法用量：請先清潔患部並保持患部乾爽，再把藥布裡面的塑膠膜拉開，將藥布敷於患部，每日一次或兩次(可視患部情況而定)。如有需要亦可用繃帶綁緊藥布，入浴前一小時請將藥布撕去，浴後半小時再使用。

類別：醫師藥師藥劑生指示藥品。

諮詢專線：04-7524166

【使用上注意事項】：

- 一、有下列情形者，請勿使用：
(一)曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，請洽醫師診治：
(一)深部皮膚組織感染。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
(一)2歲以下。
(二)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

四、其他使用上注意事項：

- (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
- (二)避免陽光直射。
- (三)勿超過建議使用量。
- (四)塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
- (五)本藥限於皮膚外用不得內服，或用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜。
- (六)本藥勿使用於大面積之體表(以使用者的兩手掌為參考)或皮膚深部感染。
- (七)使用後請勿覆蓋，以免增加副作用。
- (八)不可連續使用超過二星期。
- (九)癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用非類固醇類消炎劑(本藥)會使病情惡化。
- (十)皮膚的黴菌感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用非類固醇類消炎劑(本藥)會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。
- (十一)為確保品質，將未使用的藥布放置於原封套內並夾縫密合。

【警 告】：

- 一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫生藥師或藥劑生。

身體部位	副作用
皮膚	偶有搔癢、灼熱感、局部發紅、過敏性皮膚炎

- 二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
(一)若有任何不適情況產生。
(二)自覺狀況沒有改善或更惡化。
(三)白血球減少症、血小板減少症、顆粒性白血球缺乏病、胃腸出血及尿血症、視覺問題。

總經理：大山醫藥有限公司
地址：台中市北區博館一街73號1樓
委託者：耀民企業股份有限公司
地址：高雄市左營區民族一路707號
製造廠：德山製藥股份有限公司
地址：嘉義縣民雄鄉民雄工業區中山路38號



【包裝】：14g(10cmX14cm)/片，
鋁箔袋裝。
【儲存條件】：儲存於25℃以下。

衛署藥製字第047948號

