

降壓劑

"中美" 血平佳[®] 錠Shpynja[®] Tablets "C.M."

衛署藥製字第029804號

【成分】每錠含：

Atenolol.....	100mg
Chlorthalidone.....	25mg
Food Color Yellow No.4、Silicon Dioxide、Mannitol、Polyvinylpyrrolidone S630、Polyplasdone XL、Sodium Lauryl Sulfate、Talc、Magnesium Stearate、Sodium Starch Glycolate	

【藥理作用】

- (一) Atenolol 為心臟選擇性 β -阻斷劑，Chlorthalidone 為利尿劑，兩者併用可有效控制高血壓。
- (二) Atenolol：
1. 降低反射性之立直性心跳快速。
 2. 延長 Sinus Cycle 及靜脈竇結(Sinusnode)之恢復時間。
 3. 延長房室結之傳導時間。
 4. 降低休息及運動時之心跳速率。
 5. 降低休息及運動時之心收縮壓及舒張壓。
 6. 抑制 Isoproterenol 所產生之心跳快速。
 7. Catecholamines 之競爭性阻斷劑降低心輸出量。
 8. 抑制 Renin 之活性。
- (三) Chlorthalidone：作用於腎元亨利氏管上行枝之皮質段，大量增加 NaCl 之排出產生利尿作用。

【適應症】高血壓。

【用法用量】成人：每日服用一錠，必要時可與其他抗高血壓藥物併用。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

1. 患有充血性心衰竭之高血壓病人，同時服用 Digitalis 和利尿劑時，應小心服用本品，必要時停藥。
2. 腎功能不全者應小心服用本品，腎臟病患者服用 Thiazides 會產生氮血症，在服用本品期間，得知腎功能不全，應立即停藥。
3. 肝功能不全、肝病者服用本品可能會產生肝性昏迷(Hepatic Coma)應小心使用。
4. 手術麻醉前48小時應停藥。
5. 作副甲狀腺功能檢查時，須停藥。
6. β -接受體阻斷效果會被 Dobutamine 和 Isoproterenol 所抑制。
7. 避免和 Lithium 併用，因為腎之廓清率會降低而升高 Lithium 之毒性。
8. 同時服用本品和 Clonidine，欲停藥時不可同時停藥，應先停止服用本品數天，再逐漸減少 Clonidine 之用量。
9. 服用本品可能會降低對 Glucose 之耐受性，糖尿病患者服用本品時，應多作檢查。

【禁用】

竇性心跳徐緩(Sinus Bradycardia)；2~3度心傳導阻礙者；心因性休克(Cardionogenic Shock)；無尿症；對本品或 Sulfonamide 類藥品過敏者禁用本品。

【副作用】

噁心、眩暈、痙攣、厭食、肌肉疲勞、白血球減少，顆粒性白血球減少，血小板減少，再生不能性貧血，停藥後症狀即可消失。

【包裝】2~1000粒瓶裝、鋁箔盒裝

【儲存】本品存放應避光、熱及潮濕

委託者：

興中美生技有限公司
Sino Advance Biotech Co., Ltd.
台北市內湖區瑞光路618號5樓之1 電話:02-87513383

製造廠：

PIC/S GMP 藥廠
中美兄弟製藥股份有限公司
彰化市彰德路106號 諮詢專線: 04-7524166
<http://www.chungmei.com.tw>